

LART: Données de 2015

Salmonella

N=66

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	Souches résistantes aux C3G Nb (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	17	0 (0)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	17	0 (0)
Hôpital d'enfants de Tunis	16	0 (0)
Hôpital la Rabta	14	0 (0)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	0	-
Hôpital Aziza Othmana	0	-
Hôpital Abderrahmen Mami-Ariana	1	0 (0)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	1	0 (0)
Total	66	0 (0)

Distribution des souches de *Salmonella* selon le prélèvement (N=66)

	Nombre	%
Selles	17	25,8
Hémocultures	21	31,8
Urine	13	19,7
Abcès/pus	3	4,5
Ponction	12	18,2
Autres	0	0,0

Distribution des souches de *Salmonella* selon les services (N=66)

	Nombre	%
Médecine	20	30,3
Pédiatrie	23	34,8
Chirurgie	7	10,6
Réanimation	3	4,5
Onco-hématologie	4	6,1
Ambulatoire	9	13,6
Gynécologie	0	0,0

Distribution des souches de *Salmonella* selon le sérotype (N=66)

	Nombre	%
S. Typhi	1	1,5
S. Enteritidis	18	27,3
S. Typhimurium	10	15,2
<i>Salmonella</i> spp.	28	42,4
Autres*	9	13,6

*: NP par tous les centres ; **Kentucky (1), Brandenburg (2), Schwarzengrund (1), Bredney (2) Kottbus(1), Lindenburg(1), INFANTIS(1)**


Taux de résistance aux antibiotiques de *Salmonella spp* (N=60)

Antibiotiques	Nb	%R	%R+I
Amoxicilline	58	27,6	27,6
Amoxicilline – Acide clavulanique	62	4,8	9,7
Cefotaxime / Ceftazidime	60	0,00	0,00
Imipénème	61	0,00	0,00
Gentamicine	41	0,0	0,0
Amikacine	53	0,00	0,00
Ac nalidixique*	58	41,4	43,1
Cotrimoxazole	41	19,5	19,5
Chloramphénicol	41	2,4	2,4
Tétracycline	51	35,3	35,3

*: la résistance est croisée aux fluoroquinolones

Évolution de résistance aux quinolones

Résistance aux quinolones



* : 2001 à 2007 : quinolones non testées à l' H d' enfants