

**LART : Données de 2020**

***Enterococcus faecalis***  
**(N=503)**

# Répartition des souches selon les centres

Centres Hospitalo-Universitaires (CHU)	Nombre de souches (%)	% des souches résistantes de haut niveau à la gentamicine
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	-	-
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	152 (30,2)	44 (29,1)
Hôpital d'enfants de Tunis	27 (5,4)	3 (11,1)
Hôpital la Rabta	127 (26,6)	-
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	26 (5,2)	0
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	1 (0,2)	0
Hôpital Aziza Othmana	11 (2,2)	2 (18,2)
Hôpital Abederrahmen Mami Ariana	37 (7,4)	2 (11,1)
Centre de Traumatologie et des Grands Brulés	37 (7,4)	3 (8,1)
Hôpital Farhat Hached Sousse	-	-
Hôpital Fattoum Bourguiba de Monastir	85(16,9)	6 (22,2)
<b>Total</b>	<b>503 (100)</b>	<b>60 (20,3)</b>

# Distribution des souches de *E. faecalis* selon les prélèvements (N=495)

	Nombre	%
Urines	330	66,7
Prélèvements pulmonaires	1	0,2
Ponctions	10	2,0
Hémocultures	55	11,1
Pus	77	15,6
Autres*	22	4,4

\*Matériel, vaginite

## Distribution des souches de *E. faecalis* selon le service (N=498)

	Nombre	%
<b>Chirurgie</b>	150	30,1
<b>Médecine</b>	60	12,0
<b>Gynécologie</b>	15	3,0
<b>Néonatalogie</b>	2	0,4
<b>Pédiatrie</b>	39	7,8
<b>Ambulatoire</b>	112	22,5
<b>Urgences</b>	56	11,2
<b>Réanimation</b>	60	12,0
<b>Onco-hématologie</b>	4	0,8

# Taux de résistance aux antibiotiques de *E. faecalis*

	Total		Urines		Hémocultures	
	N testés	%R	N testés	%R	N testés	%R
<b>Amoxicilline</b>	493	0,0	320	0,0	53	0,0
<b>Gentamicine (Haut niveau)</b>	296	20,3	196	24,0	41	19,5
<b>Erythromycine</b>	467	53,5	311	55,6	49	55,1
<b>Rifampicine</b>	266	36,5	160	51,9	21	38,1
<b>Vancomycine/teicoplanine</b>	491	0,2	320	0,0	53	0,0
<b>Tigécycline</b>	235	0,0	159	0,0	33	0,0
<b>Linézolide</b>	462	0,0	299	0,0	50	0,0
<b>Nitrofuranes</b>	-	-	269	3,7	-	-
<b>Fosfomycine</b>	-	-	280	0,4	-	-

# Taux de résistance aux antibiotiques de *E. faecalis* résistant de HNG

	N testés	%R
Amoxicilline	60	0
Erythromycine	60	66,7
Rifampicine	8	75,0
Vancomycine/teicoplanine	60	3,3
Tigécycline	15	0,0
Linézolide	53	0,0

# Évolution du taux global de résistance de haut niveau à la gentamicine de *E. faecalis* (2000-2020)

